

EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Faza revitalizacije			Bio-SK	BSK 30ml/10L vode mikroorganizmi
Predspomladansko škropljenje	ff B-C	AKARINOZA ERINOZA	NEEM cake Bio-ZE – vulkanska moka Bio-BEN – vulkanska zemlja Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	Pred škropljenjem je potrebno pognojiti z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. V času škropljenja s čajno mešanico temperature nad 10°C.
Škropljenje proti oidiju in rdečem listnem ožigu	ff D mladika dolga 2-4 cm	AKARINOZA ERINOZA OIDIJ RDEČI LISTNI OŽIG	NEEM tonic Bio-Zel	NT BZ 35ml/10L vode
Škropljenje proti peronospori in oidiju	Mladika dolga 10 cm	OIDIJ PERONOSPORA RDEČI LISTNI OŽIG	KELP tonic	Rjave alge KELP škropimo v času sonca! Dodamo sladkor in mleko! KT
Škropljenje proti peronospori in oidiju	Mladika dolg 20 cm	OIDIJ PERONOSPORA RDEČI LISTNI OŽIG	NEEM tonic Bio-Zel BIO-SK	NT BZ 25ml/10L vode BSK 20ml/10L vode
Škropljenje proti peronospori	Pred cvetenjem	OIDIJ PERONOSPORA	KELP tonic	KT mikroorganizmi
Škropljenje proti peronospori	Po cvetenju	OIDIJ PERONOSPORA	KELP tonic Bio-SK	KT BSK 25ml/10L vode
Škropljenje proti peronospori	Jagode velikost grisa	OIDIJ PERONOSPORA	NEEM tonic Bio-Zel	NT BZ 25ml/10L vode
Škropljenje proti peronospori	Jagode velikost graha	OIDIJ PERONOSPORA	KELP tonic Bio-zel	KT BZ 25ml/10l vode
Škropljenje proti peronospori	Čas debeljenja jagod	OIDIJ PERONOSPORA	KELP tonic Bio-zel	Pomembni so vremenski pogoji Slabo vreme škropimo na 6-8 dni! Dobro vreme škropimo na 10-12 dni! KT BZ
Škropljenje proti peronospori	Čas zapiranja grozdov	OIDIJ PERONOSPORA BOTRITIS	KELP tonic Bio-zel	Škropimo ločeno v razmaku 2 dni. mikroorganizmi
Škropljenje proti botritisu	Čas barvanja jagod	BOTRITIS	KELP tonic Bio-SK	KT BSK 30 ml/10L vode
	Čas pojava zemljemirke	ZEMLJEMIRKA		Ponoči jo pobiramo ali debela namažemo z lepilom za miši.

EKOLOŠKO SADJARSTVO

JABLANE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Predpomladansko škropljenje APRIL	Brstenje do mišjega ušesa	AMERIŠKI KAPAR JAJČECA LISTNIH UŠI JABLANOV CVETOŽER ŠKRLUP	NEEM tonic KELP tonic	Razmik med škropljenjem naj bo 4 dni! NT 120 ml/10L vode KT 10 ml/10 L vode
Škropljenje pred cvetenjem	Tik pred cvetenjem	ŠKRUP JABLANOVA PLESEN	KELP tonic	Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT 10 ml/10 L vode
Škropljenje po cvetenju	Venčni listi so odpadli	ŠKRLUP LISTNE UŠI	NEEM tonic	NT 120 ml/10L vode
Poletno škropljenje JUNIJ	Plodovi debeline 1 cm	ŠKRLUP LISTNE UŠI RDEČA SADNA PRŠICA	NEEM tonic	NT 120 ml/10L vode
Poletno škropljenje JULIJ AVGUST		ŠKRLUP LISTNE UŠI RDEČA SADNA PRŠICA	KELP tonic + Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	Pomembni so vremenski pogoji Slabo vreme škropimo na 7 dni! Dobro vreme škropimo na 21 dni! Izmenjujemo KELP tonic alge in zeliščni čaj! V drugi polovici avgusta škropimo zadnjič! KT 10 ml/10 L vode + BZ 30 ml /10L vode
Zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	V času zimskega mirovanja priporočamo gnojenje z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

JABOLČNI ZAVIJAČ

Prvi nalet – škropimo 10 dni pred pričakovanim naletom z Neem tonicom. V času naleta ponavljamo na 8 dni. NT 120 ml/10L vode

Drugi nalet – ponovimo kot pri prvem naletu. Učinkovitost nad 80%. NT 120 ml/10L vode

HRUŠKE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Zimsko škropljenje MAREC APRIL	Brti še mirujejo	HRUŠEVA BOLŠICA AMERIŠKI KAPAR JAJČECA LISTNIH UŠI	NEEM tonic + Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	NT 20ml/10l vode BZ 50ml/10l vode
Predpomladansko škropljenje KONEC APRILA	Brti so napeti	ŠKRLUP NA VEJICAH	KELP tonic + Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Škropljenje pred cvetenjem MAJ	Rdeči ali balon cvetenje	ŠKRLUP	KELP tonic + Bio-SK	KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Škropljenje po cvetenju MAJ	Plodiči se razvijajo	ŠKRLUP HRUŠICA BOLŠICA LISTNE UŠI	NEEM tonic	Uporaba MINIMALNE koncentracije!!! NT 20ml/10l vode
Poletno škropljenje		HRUŠEVA RJA ŠKRLUP LISTNE UŠI	KELP tonic + Bio-Zel	Pomembni so vremenski pogoji. Slabo vreme - škropimo na 7 dni! Dobro vreme - škropimo na 21 dni! Hruševo rjo uspešno odstranjujemo z algami (KELP tonic). Če je drevo že napadeno, škropimo pogosteje (na 14 dni), drugače po koledarju. KT 10ml/10l vode BZ 25ml/10l vode
Zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	V času zimskega mirovanja priporočamo gnojenje z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

BRESKVE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Zimsko škropljenje MAREC	Brsti še mirujejo	BRESKOVA KODRAVOST LISTNA LUKNJIČAVOST	KELP tonic + Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	Ponavljamo do cvetenja na 10 dni! KT 150ml/10l vode BZ 50ml/10l vode
Škropljenje po cvetenju MAJ	Venčni listi so popolnoma odpadli	BRESKOVA KODRAVOST LISTNA LUKNJIČAVOST LISTNE UŠI	NEEM tonic KELP tonic	NT 100ml/10l vode KT 10ml/10l vode Škropimo izmenično!
Poletno škropljenje po cvetenju		BRESKOVA KODRAVOST LISTNA LUKNJIČAVOST LISTNE UŠI	KELP tonic Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	Škropimo še 2x na 21 dni! Drugače po koledarju. KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	V času zimskega mirovanja priporočamo gnojenje z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

MARELICE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Predpomladansko škropljenje MAREC	V času mirovanja	MONILIJA LISTNA UKNJIČAVOST	NEEM tonic + Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	NT 150ml/10l vode BZ 50ml/10l vode
Škropljenje v cvet APRIL	Začetek cvetenja	MONILIJA LISTNA LUKNJIČAVOST	KELP tonic + Bio-Zel	Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT 10ml/10l vode BZ 30ml/10l vode
Škropljenje v cvet APRIL MAJ	Polni cvet	MONILIJA	KELP tonic	KT 10ml/10l vode
Škropljenje po cvetenju JUNIJ JULIJ		MONILIJA	KELP tonic + Bio-Zel	KT 10ml/10l vode BZ 25ml/10l vode
Škropljenje po cvetenju JULIJ AVGUST		MONILIJA LISTNE UŠI	NEEM tonic Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	NT 100ml/10l vode BSK – 50ml/10l vode
Zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	V času zimskega mirovanja priporočamo gnojenje z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. Rastlina lepša bujnejša!

ČEŠNJE in VIŠNJE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Predpomladansko škropljenje MAREC	V času mirovanja	KAPAR LISTNE UŠI MONILIJA LISTNA UKNJIČAVOST	NEEM tonic + Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	NT 150ml/10l vode BZ 50ml/10l vde
Škropljenje v cvet (odvisno od sorte)	cvetenje	MONILIJA LISTNA UKNJIČAVOST ČEŠNJEVA PEGAVOST	KELP tonic	Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT 10ml/10l vode
Škropljenje po cvetenju SREDI MAJA (odvisno od sorte)	Plodiči se razvijajo	MONILIJA LISTNE UŠI ČEŠNJEVA PEGAVOST	NEEM tonic NEEM cake	Področje po krošnjo zalijemo z NEEM tonic in pognojimo z NEEM cake. NT 150ml/10l vode NC 300g/drevo
Škropljenje po cvetenju KONEC MAJA	Plodovi se prično barvati	MONILIJA ČEŠNJEVA MUHA	KELP tonic NEEM tonic NEEM cake	S KELP tonic poškopimo proti moniliji. Področje po krošnjo zalijemo z NEEM tonic in pognojimo z NEEM cake.
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN.za zagotavljanje energije koreninam in drevesu. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

SLIVE, ČEŠPLJE in RINGLOJI

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Predpomladansko škropljenje APRIL	V času mirovanja	ČEŠPLJEV KAPAR LISTNE UŠI MONILIJA ROŽIČEVOST	NEEM tonic KELP tonic	Prvo škropljenje NEEM tonic in nato čez 2 dni škropljenje s KELP tonic! Rjave alge KELP škropimo v času sonca! NT 150ml/10l vode KT 10ml/10l vode
Škropljenje v cvet (odvisno od sorte)	cvetenje	MONILIJA LISTNA LUKNJIČAVOST	KELP tonic Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	Škropimo neposredno v cvet! Ponavljamo glede na vremeske razmere! KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Škropljenje po cvetenju MAJ JUNIJ JULIJ (odvisno od sorte)	Plodovi so razviti	LISTNA LUKNJIČAVOST RDEČA SADNA PRŠICA LISTNE UŠI ČEŠPLJEV ZAVIJAČ	KELP tonic Bio-SK	Ponavljamo glede na vremenske razmere! KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Škropljenje po obiranju OKTOBER NOVEMBER	Plodovi se prično barvati	MONILIJA LISTNA LUKNJIČAVOST	Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	BZ 30ml/10l vode
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	V času zimskega mirovanja priporočamo gnojenje z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

EKOLOŠKO VRTNARJENJE

KAPUSNICE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Pred sajenjem 1			NEEM tonic + Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	Zemljo razkužimo oziroma namočimo z raztopino Neem tonica + Bio zela. NT 50ml/10l vode BZ 25ml/10l vode
Pred sajenjem 2			NEEM tonic + Bio-Zel	Sadike kapusnic namočimo v raztopino Neem tonika in Bio Zela za čas 1 ure! NT 50ml/10l vode BZ 25ml/10l vode
Sajenje			NEEM cake	Jamico pognojimo z Neem cake gnojilom. NC 3g/jamico
Škropljenje za čas rasti rastline	Velikost rastline 15 cm		KELP tonic Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	Škropimo vsake 3 tedne. Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Škropljenje druga polovica AVGUSTA in drugi teden SEPTEMBRA			NEEM tonic	Poškropimo z Neem tonicom. NT 10ml/10l vode
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN.za zagotavljanje energije koreninam in drevesu. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

KELP tonic - če je zelo mokro, zalivanje
- če je suša, škropljenje v list

Drobno seme (korenje, solate) – zaliti, ko doseže 2 cm velikosti

Debelo seme (rdeča pesa, paradižnik) – namakanje

ŠPINAČNICE (špinača, mangold)

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Pred sajenjem 1			NEEM tonic + Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	Zemljo razkužimo oziroma namočimo z raztopino Neem tonica + Bio zela. NT BZ
Pred sajenjem 2			NEEM cake	Pognojimo z Neem cake.
Rastna sezona			NEEM tonic + Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka) KELP tonic + Bio-SK	Enkrat v rastni sezoni pognojimo z Neem tonicom, dvakrat s KELP tonicom. Rjave alge KELP škropimo v času sonca! NT 10ml/10l vode KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode Čaj Sladkega komarčka Bio-SK dodamo Neem tonicu in Kelp tonicu.
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN.za zagotavljanje energije koreninam in drevesu. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

ČEBULNICE (čebula, česen, šalotka, srebrna čebulica, por)

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Pred sajenjem Priporočljivo prva polovica APRILA		ČEBULNA MUHA POROVA MUHA	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN NEEM tonic Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. Večer pred sajenjem čebulnice namočimo v raztopino Neem tonika za čas noči in jih zjutraj dobro osušimo pred sajenjem. NT 150ml/10l vode BZ 100ml/10l vode
Škropljenje druga polovica APRILA do sredine MAJA		ČEBULNA MUHA POROVA MUHA	NEEM tonic	Škropimo z NEEM tonicom NT 100ml/10l vode Kurativa NT 200ml +BZ 100ml /10l vode
Škropljenje konec MAJA			KELP tonic Bio-Zel Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	Škropimo vsake 3 tedne. Rjave alge KELP škropimo v času sonca! Zalijemo s čajno mešanico. Bio-SK lahko mešamo s Kelp tonicom. KT 10ml/10l vode BSK 20ml/10l vode BZ 30ml / 10l vode
Škropljenje konec JUNIJA in JULIJA			KELP tonic + Bio-SK	KT 10ml/10l vode BSK 20ml/10l vode
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN.za zagotavljanje energije koreninam in drevesu. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

STROČNICE (grah, fižol, vrtni bob)

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Pred sajenjem			NEEM tonic Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo) NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	Večer pred sajenjem stročnice namočimo v raztopino NEEM tonika in Bio-Zela. Pred sajenjem jamico zalijemo z raztopino NEEM tonica & Bio-Zela NT 150ml/10l vode BZ 25ml/10l vode Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami Bio-ZE ali Bio-BEN.
Teden dni po sajenju			KELP tonic	Teden dni po sajenju zalijemo s KELP tonicom. KT 5ml/10l vode
Čas sajenja		VOLUHAR LISTNE UŠI		Bob posaditi po celem vrtu (1 saduka na m ²), ker odganja voluharja in privablja uši.
Obdobje rasti in kasneje.		LISTNE UŠI PRŠICE	NEEM tonic Bio-Zel	Velikost sadike 10 cm, pričnemo s škropljenjem z NEEM tonicom. Vse stročnice škropimo z NEEM tonicom vsakih 21 dni ali po potrebi v primeru pojava uši ali pršic. NT 70ml/10l vode BZ 25ml/10l vode
Obdobje rasti in kasneje.		RJA	KELP tonic Bio-Zel Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	KELP tonic, Bio-Zel in Bio-SK skupaj škropimo na 10 dni! Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT 10ml/10l vode BZ 25ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI		Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN.za zagotavljanje energije koreninam in drevesu. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

VZGOJA SADIK

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Pred setvijo	Drobno seme		KELP tonic	Namočimo v KELP tonic za 2 uri. KT 5ml/10l vode
Pred setvijo	Debelo seme (grah, fižol)		KELP tonic	Namočimo v KELP tonic za 12 ur. KT 5ml/10l vode
Setev	Velikost sejancev 2cm		KELP tonic Bio zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	Pripravimo mešanico KELP tonica in Bio-zela ter zalijemo sejance. KT 10ml/10l vode BZ 20ml/10l vode
Setev	Velikost sejancev 4 m		NEEM tonic	Sejance zalijemo z NEEM tonicom. NT 30ml/10l vode
Setev	Večji sejanci		KELP tonic Bio-Zel	Škropimo in zalivamo s KELP tonicom in zeliščno čajno mešanico. KT 10ml/10l vode BZ 25ml/10l vode

PLODOVKE (paradižnik, paprike, kumare, bučke, melone, jajčevci)

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Pred sajenjem			NEEM Tonic Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka) NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	Pred sajenjem jamico zalijemo z raztopino NEEM tonica & Bio-SK. Obvezno gnojimo sadilne jamice z mešanico z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. NT 100ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Čas sajenja	Kupljene sadike		NEEM tonic Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	Kupljene sadike obvezno namočimo v raztopino NEEM tonic in poškopimo z mešanico čajnega pripravka. NT 100ml/10l vode BZ 30ml/10l vode
Obdobje rasti in kasneje.	Plodiči		KELP tonic Bio-Zel	Plodiče v primeru sonca vsakih 7-10 dni poškopimo z mešanico KELP tonica, 1 žlice sladkorja in 1 dcl polnomastnega mleka. Enako storimo po dežju. Profesionalci 1x tedensko zalijemo s čajno mešanico. Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT 10ml/10l vode BZ 30ml/10l vode
Obdobje rasti in kasneje.			NEEM tonic Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	Preventivno škropljenje 1x mesečno pred insekti ali če se insekti pojavijo. NT 30ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI		Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. za zagotavljanje energije koreninam in drevesu. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

JAGODIČJE

(robide, maline, kosmulje, ribez)

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Zgodaj spomladi MAREC, APRIL			Bio - ZEL	Poškropimo in zalijemo z zeliščno čajno mešanico Bio-Zel. BZ
	Čas brstenja pred cvetenjem		NEEM tonic	Škropimo z NEEM tonicom. NT
	Čas po cvetenju		NEEM tonic	Škropimo z NEEM tonicom. NT
	20 dni po drugem škropljenju z Neem tonicom		KELP tonic	Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT
Do zgodnje jeseni (½ SEPTEMBRA)	Čas do 15. septembra		KELP tonic	Škropljenje s KELP tonicom ponavljamo glede na vreme: stabilno vreme na 21 dni, v primeru dežja na 10 dni. KT
POZNA JESEN, ZIMA			NEEM Cake Bio-Ze, Bio-Ben	

KORENOVKE (korenček, peteršilj, zelena, mesečna redvica, redkev, črni koren, pesa)

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Pred sajenjem			NEEM cake NEEM tonic	Pred setvijo zemljo pognojimo z Neem cake in zalijemo z raztopino NEEM tonica. NT 300ml/10l vode
Velikost sadik	4 cm		KELP tonic Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	Sadike zalijemo s KELP tonicom. KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Velikost sadik	8 cm		NEEM tonic	Sadike poškopimo z NEEM tonicom. NT 50ml/10l vode
Obdobje rasti in kasneje.		KORENČKOVA MUHA PEGAVOST RJA KORENOVK	NEEM tonic Bio-SK	Nadaljna škropljenja so odvisna od vremenskih razmer. Škropljenje z Neem tonicom proti korenčkovi muhi. Škropiti z mešanico KELP tonica in čajnim pripravkom Bio-SK proti rji in pegavosti. NT 100ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Povečanje pridelka			Bio-ZE Bio-BEN	Veliko večji pridelek dosežemo, če med rastjo pognojimo še z vulkanskimi kamninami.
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI		Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN.za zagotavljanje energije koreninam in drevesu. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

SOLATNICE

(glavnata solata, vezivka, berivka, letna in zimska endivija, motovilec, radič, kreša)

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Pred setvijo		POLŽI	NEEM cake Bio-ZE Bio-Krem	Pred setvijo zemljo pognojimo z Neem cake. Gredico obrobimo z 10 cm širokim pasom mešanice NEEM cake, Bio-ZE in Bio-Krem za preprečitev vstopa v gredico.
Flancanje solatnic			NEEM tonic Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	Če solatnice flancamo, jih prej namočimo v mešanico NEEM tonica in čajnega bakrenega pripravka Bio-Zel. NT BZ
Obdobje rasti		GNILOBE	NEEM tonic KELP tonic Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	Med rastjo zalivamo z NEEM tonicom. 2 dni pred nabiranjem poškopimo s KELP tonicom. NT 150ml/10l vode KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI		Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN.za zagotavljanje energije koreninam in drevesu. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

OLJKE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Čas mirovanja			Bio-Zel	Poškropimo in zalijemo z zeliščno čajno mešanico Bio-Zel. BZ
Pred cvetenjem			NEEM tonic	Škropimo. NT
V času cvetenja			NEEM tonic	Škropimo. NT
Takoj po cvetenju			NEEM tonic	Škropimo. NT
Po cvetenju do septembra			Bio-Zel KELP tonic	Poškropimo in zalijemo z mešanico KELP tonica in Bio-Zela na 21 dni. Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT BZ
Čas naleta oljčne muhe – prvi nalet		OLJČNA MUHA	NEEM tonic	V času 1. naleta oljčne muhe 3x uporabimo Neem tonic na 7-10 dni. NT
Čas naleta oljčne muhe – drugi nalet		OLJČNA MUHA	NEEM tonic	V času 2. naleta oljčne muhe 3x uporabimo Neem tonic na 7-10 dni. NT

KROMPIR

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Čas sajenja		VOLUHAR KOLORADSKI HROŠČ STRUNE POLŽ BRAMOR (delno)	NEEM cake NEEM tonic	Zemljo pognojimo z Neem cake. Zazaščito pred strunami sadike pomočimo v razstopino NEEM tonica.
Pred osipanjem		PLESEN GNILOBA	KELP tonic Bio-Zel	Poškropimo s KELP tonicom. Z algami vedno škropimo ob času sonca! Poškropimo z zeliščno čajno mešanico Bio-Zel.
Čas rasti	Višina do 25 cm		KELP tonic Bio-Zel	Ponovimo škropljenje s KELP tonicom. Poškropimo z zeliščno čajno mešanico Bio-Zel.
Pojav koloradskega hrošča		KOLORADSKI HROŠČ	NEEM tonic KELP tonic	Škropimo z Neem tonicom. Nadaljujemo s škropljenjem s KELP tonicom vsaj še 2x do 3x. Prilagajamo se vremenskim razmeram.
Jeseni, pozimi			NEEM Cake Bio-ZE Bio-Ben	

ARONIJE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Predpomladansko škropljenje		RAZKUŽEVANJE PRŠICA RJA	NEEM cake NEEM tonic Bio-Zel	Zemljo pognojimo z Neem cake. Poškropimo in zalijemo z mešanico Neem tonic in Bio-Zel. Vsako sadiko poškropiti z 0,5 litra mešanice (0,4l poškropiti in 0,1 zaliti). NT 100ml/10l vode BZ 50ml/10l vode NC 10g/enoletno rastlino 20g/dvoletno rastlino 30g/triletno rastlino
Februarsko gnojenje			KELP tonic Bio-SK NEEm cake	Škropimo. KT 10ml/10l vode BSK 50ml/10l vode NC 10g/enoletno rastlino 20g/dvoletno rastlino 30g/triletno rastlino
V času cvetenja			KELP tonic Bio-SK NEEm cake	Škropimo. KT 10ml/10l vode BSK 50ml/10l vode NC 10g/enoletno rastlino 20g/dvoletno rastlino 30g/triletno rastlino
Jesensko gnojenje oziroma škropljenje po obiranju		RAZKUŽEVANJE PRŠICA RJA	NEEM cake NEEM tonic Bio-Zel	Zemljo pognojimo/razkužimo z Neem cake. Poškropimo in zalijemo z mešanico Neem tonic in Bio-Zel. NT 100ml/10l vode BZ 50ml/10l vode NC 300g/rastlino

Navodila za uporabo:

v jesenskem času morate zato, če so se poleti aronije okužile z rjo, razkužiti tako tla kot same rastline. Hkrati sadike tudi pognojiti, saj jim je letos primanjkovalo hranil in niso zato bogato obrodile ali pa jagode niso bile dovolj sočne.

OREHI LEŠNIKI

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Predpomladansko škropljenje in gnojenje		OREHOVA MUHA ČRNICA	NEEM cake NEEM tonic Bio-Zel	Zemljo pognojimo z Neem cake. Škropimo oziroma zalijemo z mešanico NEEM tonica in Bio-Zela NT 150ml/10l vode BZ 50ml/10l vode NC 300g/drevo
Debelina oreha 1cm Debelina lešnika 0,5cm		OREHOVA MUHA ČRNICA	NEEM tonic Bio-Zel KELP tonic	Škropimo oziroma zalijemo z mešanico NEEM tonica in Bio-Zela NT 100ml/10l vode BZ 50ml/10l vode Škropimo oziroma zalijemo s KELP tonic. 25ml/10l vode
JULIJ			NEEM tonic Bio-Zel	Škropimo oziroma zalijemo z mešanico NEEM tonica in Bio-Zela NT 100ml/10l vode BZ 50ml/10l vode
AVGUST			NEEM tonic	Škropimo oziroma zalijemo z NEEM tonic. NT 100ml/10l vode 200ml/10l vode
SEPTEMBER			NEEM tonic	Škropimo oziroma zalijemo z NEEM tonic. NT 100ml/10l vode

Maline-Robide-Kosmulje-Ribez

	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Zgodaj spomladi MAREC, APRIL		UŠI PRŠICE STENICE MALINAR	NEEM tonic Bio-ZEL	NT 150ml/10L vode BZ 30ml/10L vode
	Čas brstenja pred cvetenjem		NEEM tonic	Škropimo z NEEM tonic 150 ml/10L vode
	Čas po cvetenju		NEEM tonic	Poškropimo z NEEM tonic. NT 150ml/10L vode
	20 dni po drugem škropljenju z NEEM tonic	SUŠICA RJE PEGAVOSTI SIVA PLESEN	KELP tonic	Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT 10ml/10L vode
Do zgodnje jeseni (1/2 SEPTEMBRA)	Čas do 15.septembra		KELP tonic Bio-ZEL	Škropljenje ponavljamo glede na vreme: stabilno vreme na 21 dni, v primeru dežja na 10 dni. KT 10ml/10L vode BZ 30ml/10L vode
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE ali Bio-BEN	Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami Bio-ZE ali Bio-BEN za zagotavljanje energije koreninam. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

JAGODE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Zgodaj spomladi MAREC, APRIL		UŠI PRŠICE STENICE MRAVLJE	NEEM cake NEEM tonic Bio-ZEL	NEEM Cake 1/2 čajne žličke na sadiko NT 120ml/10L vode BZ 25ml/10L vode
	Čas brstenja pred cvetenjem		NEEM tonic	Škropimo z NEEM tonic 120 ml/10L vode
	Čas po cvetenju	RJA LISTNE PEGAVOSTI SIVA PLESEN PEPELOVKA	KELP tonic NEEM CAKE	Poškropimo s KELP tonic. KT 15ml/10L vode Rjave alge KELP škropimo v času sonca! Za najboljše rezultate ponavljamo vsakih 7 dni
Do zgodnje jeseni (1/2 SEPTEMBRA)	Čas do 15.septembra		KELP tonic Bio-ZEL	Škropljenje ponavljamo glede na vreme: stabilno vreme na 14 dni, v primeru dežja na 7 dni. KT 10ml/10L vode BZ 25ml/10L vode
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE ali Bio-BEN	Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami Bio-ZE ali Bio-BEN za zagotavljanje energije koreninam. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

BOROVNICE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Predpomladansko škropljenje		<p>RAZKUŽEVANJE</p> <p>PRŠICE</p> <p>RJA</p>	<p>NEEM CAKE</p> <p>NEEM tonic</p> <p>Bio-ZEL</p>	<p>Zemljo pognojimo z NEEM cake</p> <p>NEEM cake 10g/enoletno sadiko</p> <p>NEEM cake 20g/dvoletno sadiko</p> <p>NEEM cake 30g/triletno sadiko</p> <p>Poškropimo in zalijemo z mešanico Neem tonic in Bio-Zel.</p> <p>Vsako sadiko poškropiti z 0,5 litra mešanice (0,4l poškropiti in 0,1 zaliti).</p> <p>NT 100ml/10L vode</p> <p>BZ 50ml/10L vode</p>
Dognojevanje skozi leto			<p>KELP tonic</p> <p>Bio-SK</p> <p>NEEM cake</p>	<p>Škropimo z mešanico KELP tonic in Bio-SK</p> <p>KT 10ml/10L vode</p> <p>Bio-SK 20 ml/10L/vode</p> <p>Dognojimo z NEEM cake:</p> <p>NC 10g/enoletna sadika</p> <p>NC 20g/dvoletna sadika</p> <p>NC 30g/triletna sadika</p>
Jesensko gnojenje oziroma škropljenje po obiranju		<p>RAZKUŽEVANJE</p> <p>PRŠICA</p> <p>RJA</p>	<p>NEEM cake</p> <p>NEEM tonic</p> <p>Bio-ZEL</p>	<p>Zemljo razkužimo in hkrati pognojimo z NEEM cake.</p> <p>Poškropimo in zalijemo z vodno mešanico NEEem tonic in Bio-ZEL.</p> <p>NT 100ml/10L vode</p> <p>BZ 50ml/10L vode</p> <p>NC 300g/rastlino</p>