

SLIVE, ČEŠPLJE in RINGLOJI

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Predpomladansko škropljenje APRIL	V času mirovanja	ČEŠPLJEV KAPAR LISTNE UŠI MONILIJA ROŽIČEVOST	NEEM tonic KELP tonic	Prvo škropljenje NEEM tonic in nato čez 2 dni škropljenje s KELP tonic! Rjave alge KELP škropimo v času sonca! NT 150ml/10l vode KT 10ml/10l vode
Škropljenje v cvet (odvisno od sorte)	cvetenje	MONILIJA LISTNA LUKNJIČAVOST	KELP tonic Bio-SK (čajni izvleček sladkega komarčka)	Škropimo neposredno v cvet! Ponavljamo glede na vremeske razmere! KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Škropljenje po cvetenju MAJ JUNIJ JULIJ (odvisno od sorte)	Plodovi so razviti	LISTNA LUKNJIČAVOST RDEČA SADNA PRŠICA LISTNE UŠI ČEŠPLJEV ZAVIJAČ	KELP tonic Bio-SK	Ponavljamo glede na vremenske razmere! KT 10ml/10l vode BSK 30ml/10l vode
Škropljenje po obiranju OKTOBER NOVEMBER	Plodovi se prično barvati	MONILIJA LISTNA LUKNJIČAVOST	Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	BZ 30ml/10l vode
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	V času zimskega mirovanja priporočamo gnojenje z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!